

氏名：

レジメン名：FOLFOX4+Cet

	Day1	Day2	Day8	Day14
注射	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	レボホリナート注100mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 2時間	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	
	デキサメタゾン注9.9mg+グラニセトン注3mg 30分	5-FU注400mg/m ² +生食50mL 全開投与	デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL 30分	
	セツキシマブ注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² +生食250mL 2時間	5-FU注600mg/m ² +生食 全量110mL 22時間	セツキシマブ注250mg/m ² +生食250mL 1時間	
	レボホリナート注100mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 2時間 オキサリプラチン注と同時に投与		生食50mL	
	オキサリプラチン注85mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナート注と同時に投与			
	5-FU注400mg/m ² +生食50mL 全開投与			
	5-FU注600mg/m ² +生食 全量110mL 22時間			

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

ざ瘡様皮疹

爪囲炎

下痢

しびれ・寒冷刺激

悪心・嘔吐

骨髄抑制

口内炎

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】

【その他】

入院して点滴をします

初回投与前にKRAS遺伝子の検査をします

佐々総合病院