

氏名：

レジメン名：PTX+Ramucirumab

	Day1	Day8	Day15	Day21	Day 28
注射	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分		
	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分		
	ラムシルマブ8mg/kg+生食 1時間	ラムシルマブ8mg/kg+生食 1時間	ラムシルマブ8mg/kg+生食 1時間		
	生食50mL	生食50mL	生食50mL		
	パクリタキセル80mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間		パクリタキセル80mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間		
生食50mL		生食50mL			

【投与回数】

回

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

しびれ

脱毛

悪心・嘔吐

関節痛・筋肉痛

骨髄抑制

むくみ

鼻出血

高血圧

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】

【その他】

アルコールアレルギーの方には投与できません

過敏反応に注意(投与10分以内に多い)

佐々総合病院