

氏名：

レジメン名：Pertuzumab+Tmab+weeklyPTX

	Day1	Day8	Day15	Day21
注射	ペルツズマブ(初回840mg 以降420mg)+ 生食100mL 1時間30分	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩5mg+ 生食50mL 10分	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩5mg+ 生食50mL 10分	
	ブドウ糖5%50mL 30分	デキサメタゾン6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分	デキサメタゾン6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分	
	トラスツズマブ(初回8mg/kg 以降6mg/kg)+ 生食100mL 1時間30分	パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 1時間	パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 1時間	
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩5mg+ 生食50mL 10分	生食50mL フラッシュ用	生食50mL フラッシュ用	
	デキサメタゾン6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分			
	パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 1時間			
	生食50mL フラッシュ用			

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

心機能障害

しびれ

脱毛

悪心・嘔吐

関節痛・筋肉痛

骨髄抑制

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】

【その他】

アルコールアレルギーの方には投与できません

過敏反応に注意(投与10分以内に多い)

適応：HER-2陽性乳癌