

氏名：

レジメン名：weeklyPTX+BV

	Day1	Day8	Day15 (=Day1)	Day21	Day 28
注射	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg+ 生食50mL 10分	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg+ 生食50mL 10分	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg+ 生食50mL 10分		
	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+ グラニセトロンバッグ3mg 30分		
	パクリタキセル90mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間	パクリタキセル90mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間	パクリタキセル90mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間		
	生食50mL 30分	生食50mL フラッシュ用	生食50mL 30分		
	ペバシズマブ10mg/kg+生食100mL 初回90分 2回目60分 以降30分		ペバシズマブ10mg/kg+生食100mL 初回90分 2回目60分 以降30分		
	生食50mL フラッシュ用		生食50mL フラッシュ用		

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

しびれ

脱毛

悪心・嘔吐

関節痛・筋肉痛

高血圧

出血・塞栓症

骨髄抑制

むくみ

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】

【その他】

適応：手術不能又は再発乳癌

アルコールアレルギーの方には投与できません

過敏反応に注意(投与10分以内に多い)

佐々総合病院