

氏名：

レジメン名： nabPTX+Ramucirumab

	Day1	Day8	Day15 (= Day 1)	Day21	Day 28
注射	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分		
	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分	デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトロン3mg 30分		
	ラムシルマブ8mg/kg+生食 初回1時間、2回目以降30分	アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分	ラムシルマブ8mg/kg+生食 初回1時間、2回目以降30分		
	生食50mL	生食50mL	生食50mL		
	アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分		アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² + 生食 30分		
	生食50mL		生食50mL		

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

脱毛

悪心・嘔吐

骨髄抑制

むくみ

鼻出血

高血圧

末梢神経障害及び末梢神経障害性疼痛

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 ラムシルマブ
アルブミン懸濁型パクリタキセル

【その他】

アルブミン懸濁型パクリタキセルは特定生物由来製品です

東京都西東京市田無町4-24-15

医療法人社団時正会 佐々総合病院

電話 042-461-1535 (代)

薬剤科