

氏名：

レジメン名：IP

	Day1	Day3	Day8	Day15	Day28
注射	補液500mL 2時間	ジーラスタ皮下注3.6mg	デキサメタゾン注9.9mg+グラニセトロン注3mg 30分	デキサメタゾン注9.9mg+グラニセトロン注3mg 30分	
	↓ デキサメタゾン注9.9mg+パロノセトロン注0.75mg+生食100mL 30分		イリノテカン注60mg/m ² +ブドウ糖5%500mL 2時間	イリノテカン注60mg/m ² +ブドウ糖5%500mL 2時間	
	↓ イリノテカン注60mg/m ² +ブドウ糖5%500mL 1.5時間		生食50mL	生食50mL	
	↓ シスプラチン注 60mg/m ² +生食500mL 2時間				
	↓ 補液500mL 2時間				

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

悪心・嘔吐
骨髄抑制
腎機能障害
脱毛
下痢

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 イリノテカン mg
シスプラチン mg

【その他】

入院の場合、初日の補液は合計3L投与することがあります
飲み薬の吐き気止めの薬を使用する場合があります

東京都西東京市田無町4-24-15
医療法人社団時正会 佐々総合病院
電話 042-461-1535 (代)
薬剤科