

氏名：

レジメン名：mFOLFOXIRI+BV

| | Day1 | Day3 | Day8 | Day14 |
|----|--|--------------------|------|-------|
| 注射 | ペバシズマブ5mg/kg+生食100mL 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 | ペグフィルグラスチム皮下注3.6mg | | |
| | デキサメタゾン注9.9mg+パロノセトロン注0.75mg+生食100mL 30分 | | | |
| | イリノテカン注150mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 1時間 | | | |
| | レボホリナート注200mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 2時間 オキサリプラチン注と同時に投与 | | | |
| | オキサリプラチン注85mg/m ² +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナート注と同時に投与 | | | |
| | 5-FU注2400mg/m ² +生食 合計100mL 46時間 インフューザーポンプを使用 | | | |
| | 生食50mL | | | |
| | 生食50mL | | | |

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

下痢
しびれ・寒冷刺激
脱毛
悪心・嘔吐
骨髄抑制
口内炎

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 ペバシズマブ
イリノテカン
レボホリナート
オキサリプラチン
5-FU

【その他】

遺伝子多型の検査(UGT1A1)を初回投与前にします

東京都西東京市田無町4-24-15
医療法人社団時正会 佐々総合病院
電話 042-461-1535 (代)
薬剤科