


レジメン名：FP+Pembrolizumab(6コースまで)
5-FU+Pembrolizumab(7コースから)

	Day 1	Day 2~3	Day 4~Day 5	Day 6~21
内服	アブレピタント125mg	アブレピタント80mg		
注射	補液 合計 3L	デキサメタゾン注6.6mg+生理食塩水 30分		
	ペムブロリズマブ200mg+生理食塩水 30分	5-FU 800mg/m ² +生理食塩水 24時間		
	デキサメタゾン注9.9mg+ パロノセトロン注0.75mg 30分			
	シスプラチン注 80mg/m ² +生理食塩水 2時間 (1-6回目に投与 7回目以降は投与しません)			
	5-FU 800mg/m ² +生理食塩水 24時間			

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

悪心・嘔吐
口内炎
腎機能障害
しゃっくり
かゆみ
下痢

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 ペムブロリズマブ 200mg
シスプラチン mg (6回投与します)
5-FU 1回 mg を5日間投与します

【その他】

1-6回目は3種の抗癌剤、7回目以降はペムブロリズマブと5-FUのみ投与します
シスプラチン投与前後に補液や経口より水分補給をします
入院して点滴をします
甲状腺機能・副腎機能等の検査を定期的実施します

東京都西東京市田無町4-24-15
佐々総合病院
2024.7